

一、2014 年 WHO 發布《酒精與健康全球狀況報告》中顯示，2012 年全球因酒精濫用造成 330 萬人死亡，超過愛滋病、肺結核、暴力事件死亡人數的總和，平均每 10 秒鐘就有一人因飲酒死亡。

二、根據世界醫學期刊在 2010 的一篇論文指出，若將物質使用(包括：合法的物質，如酒精；與非法的物質，如海洛因)所造成的傷害，使用酒精對自己和對他的傷害分數(72 分)遠大於海洛因(65 分)。更甚大於菸草(26 分)。

三、台灣大學公共衛生學院指出，台灣人飲酒盛行率(12-64 歲)，由 2005 的 45.4%，到 2014 年竟激增到 58.8%，尤其青少年飲酒問題日益嚴重，根據 2004~2006 年調查，高中生飲酒人數從 13.51%上升到 26.08%，青少年接觸酒精，將阻礙其大腦與神經發展，也將衍生如翹家、吸毒、酒駕等社會問題。

再針對 2630 位國小學生(10-12 歲)調查，高達 36%的學童已喝過酒，其中 20.8%曾經自行買過酒，調查中發現，學校周圍便利商店密度愈高，中學生半年內有喝酒的機率愈大，便利商店成了主要買酒來源（將近 70%）。